



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО «Хематекс»  
Минский район

К.В.Николаенко  
2019 г.

## **ИНСТРУКЦИЯ по применению средства для обработки вымени перед доением «ОКСИШИЛД КМ»**

### **1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

- 1.1 «ОКИШИЛД КМ» (далее средство) представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с запахом применяемого сыра.
- 1.2 Состав: вода, глицерин, комплекс ПАВ, перекись водорода, консервант.
- 1.3 Средство выпускают в полимерной упаковке по 1, 5, 10, 20, 200 дм<sup>3</sup>.
- 1.4 Средство хранят в упаковке изготовителя, вдали от источников тепла, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от + 5 °С до + 30 °С.  
Срок годности - 3 (три) года от даты изготовления при условии соблюдения правил хранения.

### **2 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ**

- 2.1 Средство предназначено для очистки сосков вымени крупного и мелкого рогатого скота от органических загрязнений перед доением.
- 2.2 Обработка сосков вымени должна проводиться в обязательном порядке перед каждым доением.
- 2.3 Препарат готов к применению, не требует разведения и размешивания.
- 2.4 Нанести средство на соски вымени методом окунания или автоматическим способом. Для более равномерного нанесения, при ручном способе обработки, рекомендуется использовать специальный стаканчик для обработки сосков с пенообразователем. С этой целью нужно заполнить стаканчик средством, несколькими нажатиями на стаканчик создать в стаканчике пену и опускать в нее каждый сосок на полную длину. После обработки вытереть соски мягкой салфеткой. Время экспозиции до смывания пены - 30 сек. Верхнюю часть стаканчика после каждой обработки, необходимо тщательно ополаскивать водой.
- 2.4 Расход средства зависит от размера соска вымени, а также от скорости нанесения средства.
- 2.5 Запрещается сливать использованное средство обратно в канистру (тару).

### **3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- 3.1 При работе со средством соблюдают общие правила личной гигиены и техники безопасности
- 3.2 При работе со средством необходимо избегать попадания концентрата на слизистые поверхности и в глаза.

### **4 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ**

- 4.1 В случае контакта средства со слизистой оболочкой глаз или кожей необходимо сразу же промыть пораженный участок большим количеством воды.
- 4.2 При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды маленькими глотками. При необходимости обратиться к врачу.

Начальник технического отдела  
ООО «Хематекс» Минский район

И.В.Ситник