

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора



БААСОВ Н. А.

26 СЕН 2016

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению добавки кормовой Экстравитал для восполнения дефицита витаминов, аминокислот и минеральных веществ в рационах и нормализации обмена веществ у свиней, сельскохозяйственных птиц и кроликов

(организация-производитель «NEOFARMA S.R.L.» / «НЕОФАРМА С.Р.Л.», Италия)

### I. Общие сведения

1. Экстравитал(EXTRAVITAL)–добавка кормовая для восполнения дефицита витаминов, аминокислот и минералов в рационах и нормализации обмена веществ у свиней, сельскохозяйственных птиц и кроликов.

2. Экстравитал в 1 литре содержит в качестве действующих веществ: витамин А – 18 000 000 МЕ, витамин D<sub>3</sub> – 5 000 000 МЕ, витамин Е – 4 000 мг, витамин В<sub>1</sub> – 2 000 мг, витамин К<sub>3</sub> – 2 000 мг, витамин В<sub>2</sub> – 2 000 мг, витамин В<sub>6</sub> – 1 500 мг, витамин В<sub>12</sub> – 30 мг, биотин – 50 мг, никотиновая кислота – 5 000 мг, холин хлорид – 25 000 мг, L-Лизин – 17 500 мг, аргинин – 1 200 мг, L- треонин – 11 000 мг, DL-Метионин – 12 500 мг, глицин – 21 500 мг, глутаминовая кислота – 2 700 мг, L-триптофан – 2 800 мг, L-валин – 14 000 мг, аспарагиновая кислота – 1 600 мг, хелат цинка – 1 000 мг, хелат марганца – 2 500 мг, хелат меди – 500 мг, селен – 25 мг, а также вспомогательные вещества: глицерин полиэтиленгликоль рицинолеат - 75000 мг/л, вода очищенная – до 1 л.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов и организмов.

Содержание вредных примесей не превышает допустимых норм РФ.

3. Экстравитал представляет собой вязкую жидкость темно-желтого цвета, со специфическим запахом.

4. Выпускают Экстравитал в форме эмульсии, расфасованной по 1 и 5 л в полимерных бутылках, по 20, 25 и 50 л в полимерных канистрах, и по 500, 900 и 1000 л в бочках.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, состава и гарантируемых показателей кормовой добавки, назначения и способа применения, объема в единице фасовки, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, информации о подтверждении соответствия, регистрационного номера, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Экстравитал хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 30°C.

Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения. Запрещается использовать добавку по истечении срока хранения.

### II. Биологические свойства

5. Витамины, входящие в состав кормовой добавки, являются катализаторами обменных процессов, позволяют свести к минимуму последствия стрессов, повысить защитные функции организма, увеличить качество продукции животноводства и птицеводства.

Аминокислоты, входящие в состав кормовой добавки, являются структурными единицами тканевых белков, ферментов, пептидных гормонов и других биологически активных



соединений. Они оказывают комплексное общеукрепляющее действие, а также способствует повышению усвояемости кормов и увеличению продуктивности у свиней, сельскохозяйственных птиц и кроликов.

Селен, входящие в состав кормовой добавки, микроэлемент антиоксидантной защиты организма. Способствует выведению токсических веществ, входит в состав ферментов селенопротеинов, гормонов, в значительной степени способствует усвоению витамина Е. Витамин Е регулирует окислительно-восстановительные процессы и влияет на углеводно-жировой обмен, усиливает действие витаминов А и D3, оказывает влияние на состояние иммунитета и общую сопротивляемость организма.

### III. Порядок применения

6. Экстравитал применяют для восполнения дефицита витаминов, аминокислот и минералов в рационах, и нормализации обмена веществ у свиней, сельскохозяйственных птиц и кроликов.

7. Экстравитал задают перорально с помощью дозатора или с водой для поения.

Нормы ввода:

- Сельскохозяйственная птица — 200-400 мл добавки на 1000 литров питьевой воды;
- Свиньи — 500-1000 мл добавки на 1000 литров питьевой воды;
- Кролики — 500-1000 мл добавки на 1000 литров питьевой воды.

8. При применении добавки кормовой в рекомендуемых количествах побочных явлений и осложнений не отмечено. Противопоказаний не установлено.

9. Экстравитал совместим со всеми ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками и лекарственными средствами.

10. Продукцию свиноводства и птицеводства после применения добавки кормовой можно использовать в пищевых целях без ограничений

### IV. Меры личной профилактики

11. При работе с Экстравиталом необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Использовать резиновые перчатки, респиратор, защитные очки и спецодежду. Не допускать контакта с глазами, дыхательной системой и кожей.

12. При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды.

13. Экстравитал следует хранить в местах, не доступных для детей.

Инструкция разработана фирмой «NEOFARMA S.R.L.», Италия, совместно с ООО «ПТК «АйБиЭс», Россия.

Адрес организации-производителя: «NEOFARMA S.R.L.», 1854, Via Emilia 47020 Longiano, Италия

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВИ-2-816/04830

