

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «БИОФИД Пропилен КМ»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. «БИОФИД Пропилен КМ» – кормовая добавка, предназначенная для повышения продуктивности и энергетической ценности кормов для коров и молодняка крупного рогатого скота.
- 1.2. «БИОФИД Пропилен КМ» в своем составе содержит: пропиленгликоль - 60 %, яблочную кислоту - 5 %, а также наполнитель – диоксид кремния до 100 %.
- 1.3. «БИОФИД Пропилен КМ» представляет собой сухую однородную мелкодисперсную массу белого цвета.
- 1.4. «БИОФИД Пропилен КМ» выпускается расфасованным по 1,0 кг, 5,0 кг 10,0 кг 25,0 кг, 30 кг в бумажных многослойных мешках.
- 1.5. Хранят в упаковке производителя, в сухом и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей при температуре от минус 10 °С до плюс 25 °С. Срок годности – 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1. Действие кормовой добавки «БИОФИД Пропилен КМ» обусловлено входящими в его состав компонентами (пропиленгликоля и яблочной кислоты), которые включаются в цикл трикарбоновых кислот, обеспечивая организм животного дополнительной энергией.
- 2.2. Под действием ферментативных процессов в рубце жвачных животных пропиленгликоль превращается, в основном, в пропионовую кислоту, которая всасывается клетками стенки рубца и с током крови поступает в печень, где используется для синтеза глюкозы. Яблочная кислота также улучшает вкусовые качества корма, что увеличивает его потребление
- 2.3. Кормовая добавка способствует нормализации обменных процессов, увеличению удоев, содержанию жира и белка в молоке, активизации роста мышечной ткани.
- 2.4. Использование кормовой добавки в кормлении коров позволяет снизить период восстановления после отела, исключить возможность послеродовых осложнений, снизить риск развития кетоза.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ

- 3.1. Добавку применяют дойным коровам, ремонтному молодняку, животным на откорме. «БИОФИД Пропилен КМ» вводят в рацион животных постепенно, приучая животных к его поеданию в течении 5-7 дней. Рекомендуется суточную норму кормовой добавки делить на два приема, смешав с зернофуражом, силосом или ввести в состав кормосмеси.
- 3.2. Рекомендуемые нормы ввода кормовой добавки « БИОФИД Пропилен КМ»:

| Группа животных | Период применения | Цель применения | Норма ввода г/гол/сут | Порядок применения |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| Коровы | 10-15 дней до | Профилактика | 250-300 | Утром до первого |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|----------|--|
| | отела 5-10 дней после отела | кетоза Увеличение потребления сухого вещества корма. Предупреждение чрезмерного снижения массы тела. | 750-1050 | кормления 3 раза в день равными дозами: - утром до кормления; - днем и вечером в смеси с объемными кормами. |
| Дойные коровы | В течении 30 дней после отела | Компенсация временного дефицита энергии. Увеличение надоя | 150-250 | - в составе кормосмеси; - с объемными кормами; - утром до первого кормления. |
| Телки старше 4-х мес. на выращивании | - | Активизация роста, увеличение среднесуточного привеса | 50-100 | - в составе кормосмеси; - с объемными кормами; - утром до первого кормления. |
| Бычки старше 4-х месяцев на откорме | - | Увеличение среднесуточного прироста | 50-100 | - в составе кормосмеси; - с объемными кормами; - утром до первого кормления. |

3.3. Продукция от животных после применения кормовой добавки «БИОФИД Пропилен КМ» может быть использована в пищевых целях без ограничений.

3.4. При применении в соответствии с рекомендациями производителя противопоказаний нет.

Превышение рекомендованной дозировки в два и более раза на протяжении длительного периода может вызывать признаки угнетения центральной нервной системы, которые полностью исчезают после исключения добавки из рациона или корректировки дозы.

3.5 Кормовая добавка «БИОФИД Пропилен КМ» не предназначена для использования в рационах других видов животных, а также в рационах крупного рогатого скота младше 4-х месяцев.

4. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с кормовой добавкой следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

4.2 Использовать индивидуальные средства защиты (респиратор, перчатки резиновые или полимерные, защитные очки, комбинезон, а при работе с большими количествами – сапоги и комбинезон). При попадании в глаза и на кожу обильно промыть их проточной водой.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1. В случае возникновения осложнений после применения кормовой добавки, ее использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению кормовой добавки в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия кормовой добавки на организм животного или несоответствии кормовой

добавки по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия кормовой добавки нормативной документации.

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Общество с ограниченной ответственностью «Хематекс» Минский район», 223064, Минский район, Луговослободской с/с, район аг. Луговая Слобода, 57.

